

7. Sols mal drainés (même si apparemment secs en surface)



Potentille ansérine (*Potentilla anserina* ou **Argentina anserina**)

7.1. Potentille ansérine ou potentille des oies (*Potentilla anserina* ou *Argentina anserina*) (famille des *Rosaceae*)

Plante vivace, rampante, produisant des stolons qui peuvent atteindre 50 cm de long¹ et qui s'enracinent à tous les nœuds. On la reconnaît notamment à ses longues feuilles pennées (de 10 à 20 cm) à nombreuses folioles dentées et dont les tailles de ces folioles sont très inégales. Les fleurs, de 15 à 20 mm de diamètre, présentes de juin à octobre, sont jaune soufre. Les pétales sont deux fois plus longs que les sépales. **Habitat** : La potentille ansérine vit au bord des routes, des chemins, des étangs ou des fossés (zones piétinées et rudéralisées), jusqu'à 1700 m d'altitude. Sol : plutôt argileux (selon Tela botanica).

La **potentille ansérine** aime bien l'humidité et peut supporter une certaine *salinité* du sol.

Usages médicaux : très astringente, elle serait aussi antispasmodique, hémostatique, odontalgique, analgésique par contact



7.1. Renouée persicaire ou Persicaire douce (*Persicaria maculosa*) (famille des Polygonacées)

Plante herbacée annuelle, adventice souvent envahissante. Couleur dominante des fleurs : rose ou blanc. Période de floraison : août-octobre. **Habitat type** : friches annuelles hygrophiles, eutrophiles (°), pionnières, eurasiatiques.

Riche en tanins, elle fut autrefois utilisée en tant que plante médicinale pour ses propriétés astringentes et vulnéraires.

Eutrophe : se dit d'un milieu riche en éléments nutritifs, généralement non ou très faiblement acide et permettant une forte activité biologique.

Eutrophile : qualifie une plante ou une végétation qui aime les sols ou les eaux eutrophes.



Photo Pierre GEMION